





01



02



03

ALERTAR

- Si la víctima no reacciona y ya no está respirando, o no respira con normalidad (es decir, realiza menos de 2 movimientos torácicos en 10 segundos), se debe dar aviso de inmediato.
- Pida a alguien que acceda a los servicios médicos de emergencia o hágalo usted mismo con su teléfono celular. Los servicios de emergencia podrán darle instrucciones para ayudar
- En caso de ausencia de teléfono o red, deje a la víctima para dar aviso, luego regrese y continúe con las acciones de rescate.
- Si cuenta con modo altavoz y especialmente si está solo, actívelo e inicie de inmediato la reanimación cardiopulmonar al mismo tiempo que da aviso.

MASAJE

 Realice 30 compresiones torácicas a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto, o aproximadamente 2 compresiones por segundo.

Luego, realice **2 insuflaciones** utilizando la técnica de respiración boca a boca. Posicione sus manos correctamente y realice 30 compresiones torácicas más.

- La secuencia de procedimientos de reanimación para niños es la misma que para adultos, pero es recomendable:
 - Comenzar el RCP con 5 insuflaciones iniciales antes de continuar con las compresiones torácicas.
 - Utilizar una o ambas manos, dependiendo de la contextura física del niño. Durante las compresiones torácicas, se debe comprimir un tercio del grosor del tórax.
- En caso de paro cardíaco tras un ahogamiento, es apropiado:
 - Asegurar que la víctima sea liberada del entorno acuático de manera inmediata, segura y permanente.
 - Realizar de inmediato 5 insuflaciones iniciales antes de comenzar la RCP.

DEFIBRILAR

- Obtenga un desfibrilador externo automático (DEA) solo si está a la vista o si un testigo puede traerle uno inmediatamente. Continúe con la reanimación cardiopulmonar y mientras el testigo coloca los electrodos.
- Encienda el DEA y siga las instrucciones del
 dispositivo. Descubra el pecho de la víctima y coloque los electrodos según las instrucciones del empague o de los mismos electrodos.
- Asegúrese de que nadie toque a la víctima mientras el DEA analiza el ritmo cardíaco. Lo mismo aplica si se debe administrar una descarga eléctrica.
- Reanude las compresiones torácicas e insuflaciones tan pronto como se haya entregado el choque.
- Continúe alternando series de 30 compresiones y 2 insuflaciones y siga las instrucciones del DEA hasta que lleguen los servicios médicos de emergencia.

EN SUS MARCAS, LISTOS, RESPONDAN!



Centro Mundial de Referencia en Primeros Auxilios.

Federación Internacional de la Cruz Roja y Medialuna Roja, Cruz Roja Francesa.

21 rue de la Vanne | 92120 | Montrouge | France Tel. +33 (0)1 44 43 14 46 | Email: <u>first.aid@ifrc.org</u>









http://www.globalfirstaidcentre.org

DÍA MUNDIAL DE LOS PRIMEROS AUXILIOS 2024

