

#WorldRestartAHeart

**معدل النجاة العام بعد السكتة القلبية  
خارج المستشفى  
يقارب 10%.**



**حوالي 40% من الأشخاص الذين  
يتعرضون لسكتة قلبية خارج المستشفى  
يتلقون الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)  
قبل وصول خدمات الطوارئ.**

**تنفيذ إزالة الرجفان المبكر (الصدمات  
الكهربائية) في الدقائق الأولى من الممكن أن  
يرفع من معدل النجاة حتى 80%.**

## حقائق وإحصائيات عن السكتة القلبية حول العالم

الإسعافات الأولية

**73.4% من حالات السكتة القلبية  
خارج المستشفى تحدث في المنازل،  
16.3% في الأماكن العامة، و10.3% في  
دور الرعاية.**

**في عام 2024، تم تدريب 1,471,432  
شخص على الإنعاش القلبي الرئوي من  
قبل حركة الصليب الأحمر والهلال  
الأحمر خلال الأيام العالمية.**

**الإنعاش القلبي الرئوي السريع  
يحافظ على تدفق الدم إلى الدماغ،  
مما يقلل من خطر تلف الدماغ  
الغير قابل للعلاج.**

**نسبة السكان المُدرَّبين على الإنعاش القلبي الرئوي  
تتراوح بين 3% و 79% حسب الدولة، بمتوسط عالمي  
يبلغ 40%.**

**نسبة تطبيق الإنعاش القلبي الرئوي من  
قبل العامة المتواجدين حول المريض  
تتراوح من 1.3% إلى 72% حسب الدولة.**